

# PROFISIL® FLUORIDE VARNISH

## INSTRUCTIONS FOR USE

For dental professional use only. Caution: Federal (U.S.A.) Law restricts this device to sale by or on the order of licensed dental professionals.

37479 / 3023  
Made in Germany  
www.kettenbach.com

### GEBRAUCHSANWEISUNG

Deutsch

#### Produktbeschreibung

Profisil® Fluoride Varnish haftet über mehrere Stunden sicher an der Zahnoberfläche und setzt dabei Fluoridionen frei. Der Lack enthält 5% Natriumfluorid in einem schleimhautfreundlichen Dimeticongel mit angenehmem Geschmack. Der Lack ist in den Varianten Minze, Beere und geschmacksneutral erhältlich.

#### Anwendungsgebiete

Profisil® Fluoride Varnish ist ein 5% Fluoridlack, der bei der Behandlung von hypersensiblen Zähnen einen mechanischen Verschluss der Dentinkanälchen indiziert.

#### Patientenzielgruppe

Patienten, die im Rahmen einer zahnärztlichen Maßnahme behandelt werden.

#### Potentielle allergene Stoffe

Natürliches und künstliches Beerenaroma.

#### Kontraindikationen

Ulzerierende Zahnfleisch- oder Mundschleimhautentzündungen.

Dieses Produkt nicht bei Personen mit bekannter Fluoridunverträglichkeit anwenden. Bei Anzeichen einer Entzündung oder allergischen Reaktion die Verwendung sofort abbrechen und das Produkt bei diesem Patienten nicht weiter anwenden.

#### Warnhinweise

Allergische Reaktionen auf das Produkt können bei sensiblen Personen nicht ausgeschlossen werden. Eine Sensibilisierung durch Kontakt mit der Haut / den Schleimhäuten ist möglich.

#### Vorsichtsmaßnahmen

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Nicht nach Ablauf des Verwendbarkeitsdatums anwenden.

Innerhalb von 24 Stunden nach Anwendung des Lacks dürfen keine anderen fluoridhaltigen Produkte verwendet werden.

Angemessene Schutzmaßnahmen ergreifen (z. B. Handschuhe und Schutzbrille tragen).

Augenkontakt vermeiden. Bei versehentlichem Augenkontakt: Sofort gründliches Ausspülen mit Augendusche oder Wasser. Bei auftretenden oder anhaltenden Beschwerden wenden Sie sich an einen Arzt.

Kontakt mit Kleidung vermeiden, da eine dauerhafte Schädigung von Bekleidung nicht ausgeschlossen werden kann.

Die Komponenten sind aus hygienischen Gründen für den Einmalgebrauch bestimmt.

Sicherheitsdatenblätter finden Sie unter [www.kettenbach.de](http://www.kettenbach.de).

#### Allgemeine Hinweise

Profisil® Fluoride Varnish kann auf alle Zahnoberflächen aufgetragen werden. Vor der Anwendung ist keine prophylaktische Reinigung erforderlich. Wird eine prophylaktische Reinigung durchgeführt, den Lack nach dem Scaling und Polieren auftragen. Die Zähne müssen vor dem Auftragen des Lacks nicht getrocknet werden.

#### Gebrauchsanweisung

Vor Gebrauch sicherstellen, dass die Versiegelung der Verpackungsfolie intakt ist. Die Folie des Einzeldosis-Blisters vorsichtig abziehen. Die Folie in der Nähe der Bürste anheben und die Bürste entnehmen. Die übrige Folie abziehen und den Lack freilegen.

Vor der Anwendung den Inhalt mit dem borstenlosen Ende der beiliegenden Applikatorbürste vermischen, bis eine homogene Masse entstanden ist. Die Bestandteile des Lacks können sich bei längerer Lagerung unten in der Verpackung absetzen.

Mit der beiliegenden Applikatorbürste eine dünne, gleichmäßige Schicht auf alle betroffenen Zahnoberflächen auftragen.

Der Einzeldosis-Bliester enthält ausreichend Lack für die Behandlung aller betroffenen Zähne des Ober- und Unterkiefers. Direkt nach der Anwendung nicht ausspülen lassen oder absaugen.

Nach Anwendung des Lacks den Patienten anweisen, mindestens vier Stunden lang nicht die Zähne zu putzen und keine Zahnpasta zu verwenden sowie auf heiße Getränke oder alkoholhaltige Produkte (z. B. Getränke, Mundspülungen usw.) zu verzichten und nur bei Bedarf weiche Lebensmittel zu verzehren.

Profisil® Fluoride Varnish sollte alle sechs Monate oder nach Empfehlung des Arztes aufgetragen werden.

#### Informationen für den Patienten

Heute wurde ein Lack mit 5% Natriumfluorid auf Ihre Zähne aufgetragen. Diese Behandlung schafft auf sichere Weise eine Schutzschicht für Ihre Zahnoberflächen. Um die bestmögliche Wirkung zu erzielen, beachten Sie nach Verlassen unserer Praxis bitte die folgenden Empfehlungen:

Putzen Sie mindestens vier Stunden lang nicht die Zähne und verwenden Sie keine Zahnpasta. Warten Sie falls möglich bis zum nächsten Morgen, bevor Sie Ihre normale Mundhygiene wieder aufnehmen.

Vermeiden Sie mindestens vier Stunden lang heiße Getränke und alkoholhaltige Produkte (z. B. Getränke, Mundspülungen usw.) und essen Sie nur bei Bedarf weiche Lebensmittel.

#### Reinigung und Desinfektion

Die Komponenten des Profisil® Fluoride Varnish sind aus hygienischen Gründen für den Einmalgebrauch bestimmt.

#### Lagerungsbedingungen

Trocken und vor Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahren.

Das Produkt bei 10°C/50°F–25°C/77°F aufbewahren.

#### Zusammensetzung

Polydimethylsiloxane, 5% Natriumfluorid, entsprechend 22,6 mg/g Fluoridionen, Sucralose®, filmbildendes organisches Polymer, Aroma\*.

\*nicht enthalten in der Variante "unflavored"

Bei der Produktion des Profisil® Fluoride Varnish werden keine Produkte verwendet, die Gluten, Erdnüsse, Nüsse, Soja, Sesam, Mais, Schalentiere, Eier oder Milchprodukte enthalten.

#### Entsorgung

Die leere Blisterfolie und die Bürsten entsprechend den örtlichen Bestimmungen entsorgen.

#### Warenzeichen

Profisil® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Kettenbach GmbH & Co. KG.

#### Hinweis

Nicht alle Kettenbach-Produkte sind in allen Ländern erhältlich.

Nur für den Gebrauch durch dentales Fachpersonal.

Bei auftretenden schwerwiegenden Vorfällen, die im Zusammenhang mit dem Produkt stehen, wenden Sie sich bitte unverzüglich an den Hersteller und an die zuständige Behörde.

#### Haftungsbeschränkung

Soweit ein Haftungsausschluss gesetzlich zulässig ist, übernimmt die Kettenbach GmbH & Co. KG keinerlei Haftung für Verluste oder Schäden durch dieses Produkt, gleichgültig ob es sich dabei um direkte, indirekte, besondere, Begleit- oder Folgeschäden, unabhängig von der Rechtsgrundlage, einschließlich Garantie, Vertrag, Fahrlässigkeit oder Vorsatz, handelt.

Die Angaben über Kettenbach-Produkte beruhen auf umfangreicher Forschung und anwendungstechnischer Erfahrung. Wir vermitteln diese Ergebnisse nach bestem Wissen, behalten uns aber technische Änderungen zur Produktentwicklung vor. Das entbindet den Benutzer dieser Produkte jedoch nicht davon, die Empfehlungen und Angaben bei Gebrauch zu beachten.

Stand der Information: 21. Juli 2023

### INSTRUCTIONS FOR USE

English

#### Product Description

Profisil® Fluoride Varnish is designed to securely adhere to the tooth surface for several hours while releasing fluoride ions. The varnish contains 5% sodium fluoride suspended in a mucosa-friendly, pleasantly flavored dimethicone gel. The varnish is available in following versions: mint, berry and unflavored.

#### Indications

Profisil® Fluoride Varnish is a 5% sodium fluoride varnish which produces mechanical occlusion of the dentinal tubules in the treatment of tooth hypersensitivity.

#### Patient Target Group

Patients being treated in the context of a dental procedure.

#### Potential Allergenic Substances

Natural and artificial berry flavor.

#### Contraindications

Ulcerative gingivitis and stomatitis.

Do not use this product on any individual who has a known intolerance to fluoride. If any signs of inflammation or allergic reaction occur, discontinue use immediately and refrain from further use with this patient.

#### Warnings

Allergic reactions to the product cannot be ruled out in sensitive persons.

Sensitization through contact with skin / mucous tissue is possible.

#### Cautions

Keep out of reach for children.

Do not use after the expiration date.

Do not use other products containing fluoride within 24 hours of using the varnish.

Take the appropriate protective measures (e.g. wear gloves and safety glasses). Avoid contact with the eyes. If there is accidental contact with the eyes: rinse immediately and thoroughly with an eye wash or water. Consult a medical doctor if problems arise or persist.

Avoid contact with clothing, as permanent damage to clothes cannot be excluded.

For hygienic reasons, the components are intended for single use only.

Safety data sheets are available at [www.kettenbach.com](http://www.kettenbach.com).

#### General Notes

Profisil® Fluoride Varnish can be applied to all tooth surfaces. A prophylactic cleaning is not required prior to use. If a prophylactic cleaning is performed, apply the varnish following scaling and polishing. Unnecessary to dry teeth prior to application of the varnish gel.

#### Instruction for use

Assure that the seal of the package foil is intact prior to use.

Peel off the single dose blister foil carefully. Lift the foil near the brush and remove the brush. Peel back the remaining foil to expose the varnish.

Using the supplied applicator brush, mix contents briefly to homogenize the contents prior to application using the non-brush end of the applicator brush. Constituents of varnishes tend to settle on the bottom of the package in storage.

Using the supplied applicator brush, apply a thin, even layer to all affected surfaces of the dentition.

The single dose blister contains sufficient varnish to cover all affected teeth of both the upper and lower arch. Do not rinse or suction immediately after use.

After application of the varnish, instruct the patient to refrain from brushing and flossing, avoid hot drinks and products containing alcohol (i.e.: beverages, oral rinses, etc.) and eat only soft food if necessary for at least four hours.

Profisil® Fluoride Varnish is to be applied every six months or as recommended by clinician.

#### Information for the patient

5% sodium fluoride varnish was applied to your teeth today. This treatment safely delivers a protective coating to your tooth surfaces. To obtain the maximum benefit, we ask that you follow these recommendations after you leave our office:

Do not brush or floss for at least four hours. If possible, wait until tomorrow morning to resume to normal oral hygiene.

Avoid hot drinks and products containing alcohol (i.e.: beverages, oral rinses, etc.) and eat only soft food if necessary for at least four hours.

#### Cleaning and Disinfection

The components of Profisil® Fluoride Varnish are intended for single use only.

#### Storage Conditions

Store dry, protected from sunlight.

The product must be stored between 10°C/50°F–25°C/77°F.

#### Composition

Polydimethylsiloxanes, 5% sodium fluoride equivalent to 22.6 mg/g fluoride ion, sucralose®, film forming organic polymer, flavor\*.

\*not included in the "unflavored" version

This formula is not made with products containing gluten, peanuts, tree nuts, soy, sesame, corn, shellfish, egg or dairy.

#### Disposal

The empty blister foil and brushes should be disposed in accordance with the local regulation.

#### Trademarks

Profisil® is a registered trademark of Kettenbach GmbH & Co. KG.

#### Note

Selected Kettenbach materials/products are available in certain markets only.

For dental professional use only. Caution: Federal (U.S.A.) Law restricts this device to sale by or on the order of licensed dental professionals.

If serious incidents occur that are related to the product, please immediately contact the manufacturer and the competent authority.

#### Limitation of Liability

Except where prohibited by law, Kettenbach GmbH & Co. KG will not be liable for any loss or damage arising from this product, whether direct, indirect, special, incidental or consequential, regardless of the legal basis asserted, including warranty, contract, negligence, or strict liability.

The information provided for Kettenbach products is based on comprehensive research and experience in application technology. Results are furnished to the best of our knowledge, subject to technical changes within the framework of product development.

However, users must comply with and consider all recommendations and information in connection with any use of the product.

Updated: July 21, 2023

## MODE D’EMPLOI Français

### Description du produit

Profisil® Fluoride Varnish a été développé pour obtenir une bonne adhérence à la surface dentaire pendant plusieurs heures tout en permettant la libération d’ions fluorure. Ce vernis contient 5 % de fluorure de sodium en suspension dans un gel à base de diméticone doux pour la muqueuse et agréablement parfumé. Le vernis est disponible dans les versions suivantes : menthe, fruits rouges et neutre.

### Indications

Profisil® Fluoride Varnish est un vernis à 5 % de fluorure de sodium qui génère une occlusion mécanique des tubuli dentinaires dans le traitement de l’hyper-sensibilité dentaire.

### Groupe de patients ciblés

Patients soignés dans le cadre d’un traitement bucco-dentaire.

### Substances potentiellement allergènes

Arôme fruits rouges naturel et artificiel.

### Contre-indications

Gingivite ulcéro-nécrotique et stomatite ulcéro-membraneuse.

Ne pas utiliser ce produit chez un individu présentant une intolérance connue au fluorure. En cas d’apparition d’un quelconque signe d’inflammation ou de réaction allergique, interrompte immédiatement l’utilisation et éviter tout utilisation ultérieure chez le patient concerné.

### Attention

Des réactions allergiques au produit ne peuvent pas être écartées chez les personnes sensibles. Une sensibilisation par contact avec la peau / les muqueuses est possible.

### Prudence

Tenir hors de la portée des enfants.

Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption.

Ne pas utiliser d’autres produits contenant du fluorure dans les 24 heures suivant l’utilisation du vernis.

Prendre les mesures de protection appropriées (p. ex. porter des gants et des lunettes de sécurité).

Éviter tout contact avec les yeux. En cas de contact accidentel avec les yeux : rincer immédiatement et avec précaution au moyen d’un produit oculaire ou avec de l’eau. Consulter un médecin en cas de problèmes notamment ceux persistants.

Éviter tout contact avec les vêtements, puisque des dommages permanents aux vêtements ne peuvent pas être exclus.

Pour des raisons hygiéniques, les composants sont réservés à un usage unique. Les fiches de données de sécurité sont disponibles sur le site www.kettenbach.com.

### Remarques générales

Profisil® Fluoride Varnish peut être appliqué sur toutes les surfaces dentaires. Un nettoyage prophylactique n’est pas nécessaire avant l’utilisation. En cas de nettoyage prophylactique, appliquer le vernis après le détartrage et le polissage. Il n’est pas nécessaire de sécher les dents avant l’application du vernis en gel.

### Mode d’emploi

S’assurer que le sceau du film de conditionnement est intact avant utilisation. Soulever délicatement le film du blister unidose. Décoller le film à proximité de la brosette avant de la retirer. Éliminer les résidus de film afin d’exposer le vernis. À l’aide de la brosette d’application fournie, mélanger brièvement les composants afin d’homogénéiser le contenu avant toute application à l’aide de l’extrémité sans brosette de la brosette d’application. Les composants des vernis ont tendance à se déposer au fond du conditionnement lorsqu’il est rangé. À l’aide de la brosette d’application fournie, appliquer une fine couche homogène sur toutes les surfaces touchées de la dentition.

Le blister unidose contient suffisamment de vernis pour couvrir toutes les dents touchées des arcades supérieure et inférieure. Ne pas rincer ni aspirer immédiatement après usage.

Après application du vernis, inviter le patient à éviter de se brosser les dents et de passer du fil dentaire, à éviter les boissons chaudes et les produits contenant de l’alcool (comme les boissons, les bains de bouche, etc.) et à ne consommer que des aliments mous, si nécessaire pendant au moins quatre heures.

Profisil® Fluoride Varnish doit être appliqué tous les six mois ou selon les recommandations du clinicien.

### Informations aux patients

Un vernis à base de 5 % de fluorure de sodium a été appliqué sur vos dents aujourd’hui. Ce traitement génère en toute sécurité un revêtement protecteur à la surface de vos dents. Afin d’en tirer le plus grand bénéfice, nous vous prions de bien vouloir suivre ces recommandations lorsque vous quittez notre cabinet :

Ne vous brossez pas les dents et n’utilisez pas de fil dentaire pendant au moins quatre heures. Si possible, attendez demain matin pour reprendre une hygiène bucco-dentaire normale.

Évitez les boissons chaudes et les produits contenant de l’alcool (comme les boissons, les bains de bouche, etc.) et ne consommez que des aliments mous, si nécessaire pendant au moins quatre heures.

### Nettoyage et désinfection

Les composants de Profisil® Fluoride Varnish sont réservés à un usage unique.

### Conditions de stockage

Conserver au sec, à l’abri de la lumière solaire directe.

Le produit doit impérativement être conservé entre 10°C/50°F–25°C/77°F.

### Composition

Polydiméthylsiloxanes, fluorure de sodium à 5 % équivalent à 22,6 mg/g d’ions fluorure, sucralose\*, polymère organique filmogène, arôme\*.

\*non inclus dans la version "unflavored"

Profisil® Fluoride Varnish n’est pas faite avec des produits contenant du gluten, d’arachide, de noix, de soja, de sésame, de maïs, de crustacés, d’œufs ou de produits laitiers.

### Élimination

Le blister vide, le film et les brosettes doivent être éliminés conformément à la réglementation locale.

### Marques déposées

Profisil® est une marque déposée de Kettenbach GmbH & Co. KG.

### Note

Les matériaux Kettenbach ne sont disponibles que dans des pays déterminés.

Usage réservé aux professionnels de santé bucco-dentaire.

En cas d’incident grave lié au produit, veuillez contacter immédiatement le fabricant et les autorités responsables.

### Responsabilité limitée

Dans la mesure où une exclusion de responsabilité est légalement admissible, la société Kettenbach GmbH & Co. KG n’endosse aucun responsabilité pour ce qui est de pertes ou de dégâts causés à la suite de l’utilisation de ce produit, qu’il s’agisse de dommages directs, indirects, particuliers, auxiliaires ou consécutifs, indépendamment de la situation juridique, y compris la garantie, le contrat, la négligence ou la préméditation.

Les informations fournies sur les produits Kettenbach sont basées sur des recherches approfondies et une vaste expérience des applications technologiques. Les résultats sont fournis au mieux de notre connaissance et sont sujets à des modifications techniques dans le cadre du développement de nos produits. Il est cependant nécessaire que les utilisateurs suivent et prennent en compte toutes les recommandations et les informations en rapport avec chaque utilisation.

Mise à jour : le 21 juillet 2023

INSTRUCCIONES DE USO	Español

### Descripción del producto

Profisil® Fluoride Varnish está diseñado para adherirse firmemente a la superficie del diente durante varias horas mientras libera iones de fluoruro. El barniz dental contiene fluoruro sódico al 5 % suspendido en un gel de dimeticona respetuoso con la mucosa y de sabor agradable. El barniz está disponible en las versiones siguientes: menta, frutas del bosque y sin sabor.

### Indicaciones

Profisil® Fluoride Varnish es un barniz con fluoruro sódico al 5 %, que cierra de manera mecánica los túbulos dentinarios en el tratamiento de la hipersensibilidad dental.

### Pacientes destinatarios

Pacientes que se encuentran en un tratamiento odontológico.

### Sustancias potencialmente alergénicas

Sabor a frutos del bosque natural y artificial.

### Contraindicaciones

Gingivitis y estomatitis ulcerosas.

No usar este producto en personas con intolerancia conocida al fluoruro. Si se producen signos de inflamación o de reacción alérgica, interrumpir inmediatamente el uso y no utilizar más el producto en el paciente.

No usar otros productos que contengan fluoruro en las 24 horas posteriores al uso del barniz.

### Advertencias

No es posible excluir las reacciones alérgicas al producto en las personas sensibles. Es posible que se produzca una sensibilización por el contacto con la piel / las mucosas.

### Medidas de precaución

Mantener fuera del alcance de los niños.

No usar después de la fecha de caducidad.

No usar otros productos que contengan fluoruro en las 24 horas posteriores al uso del barniz.

Tomar las medidas de precaución adecuadas (p. ej., usar guantes y gafas de seguridad).

Evitar el contacto con los ojos. En caso de contacto accidental: enjuagar inmediatamente los ojos a fondo con una ducha lavajos o agua. Consultar al médico si aparecen problemas o persisten.

Evitar el contacto con la ropa, porque pueden producirse daños permanentes en ella.

Los productos son desechables por motivos de higiene.

Las fichas de datos de seguridad están disponibles en www.kettenbach.com.

### Observaciones generales

Profisil® Fluoride Varnish puede aplicarse en todas las superficies dentales. Antes del uso no es necesario hacer una limpieza profiláctica. Si se hace una limpieza profiláctica, aplicar el barniz después del raspado y el pulido. No es necesario secar los dientes antes de aplicar el barniz en gel.

### Instrucciones de uso

Antes del uso compruebe que la lámina del envase está intacta.

Desprenda con cuidado la lámina del blister monodosis. Levante la lámina cerca del pincel y sáquelo. Despegue el resto de la lámina para acceder al barniz. Utilice el extremo opuesto del pincel aplicador suministrado para mezclar brevemente y de manera homogénea el contenido antes de la aplicación. Los componentes tienden a depositarse en el fondo del envase durante el almacenamiento. Con el pincel aplique una capa fina y uniforme sobre todas las superficies afectadas de los dientes.

El blister monodosis contiene suficiente barniz para cubrir todos los dientes afectados de las arcadas superior e inferior. No aclarar ni aspirar inmediatamente después del uso.

Después de aplicar el barniz indique al paciente que no debe cepillarse los dientes ni usar hilo dental, y que debe evitar las bebidas calientes y los productos con alcohol (p. ej., bebidas alcohólicas, enjuagues bucales, etc.). Además, durante las primeras cuatro horas solo puede tomar alimentos blandos.

Profisil® Fluoride Varnish debe aplicarse cada seis meses o según lo recomiende el médico.

### Información para el paciente

Hoy le han aplicado un barniz de fluoruro sódico al 5 % en los dientes. Este tratamiento proporciona un recubrimiento protector a la superficie de los dientes. Para conseguir el máximo beneficio, le rogamos que siga las recomendaciones siguientes cuando salga de la clínica:

No se cepille los dientes ni use hilo dental durante las próximas cuatro horas. Si es posible, espere hasta mañana para retomar su rutina de higiene bucal.

Evite beber bebidas calientes y productos con alcohol (p. ej., bebidas alcohólicas, enjuagues bucales, etc.). Además, durante las primeras cuatro horas solo puede tomar alimentos blandos.

### Limpieza y desinfección

Los componentes de Profisil® Fluoride Varnish son desechables.

### Almacenamiento

Guardar en un lugar seco protegido de la luz del sol.

El producto debe almacenarse entre 10°C/50°F–25°C/77°F.

### Composición

Polidimetilsiloxanos, fluoruro sódico al 5 % equivalente a 22,6 mg/g de iones de fluoruro, sucralosa\*, polímero orgánico formador de capa, sabor\*.

\*no incluido en la versión "unflavored"

Profisil® Fluoride Varnish no está elaborada con productos que contengan gluten, cacahuete, frutos secos, soja, sésamo, maíz, moluscos, huevo o lácteos.

### Eliminación

Los blísteres y los pinceles deben desecharse conforme a las normas legales vigentes en cada país.

### Marcas comerciales

Profisil® es una marca comercial registrada de Kettenbach GmbH & Co. KG.

### Nota

Algunos materiales Kettenbach sólo se comercializan en países determinados. Uso exclusivo por personal dental especializado.

En caso de que se produzcan complicaciones relacionadas con el producto, contacto de inmediato con el fabricante y con las autoridades competentes.

### Limitación de responsabilidad

En la medida en que sea legalmente admisible la exclusión de responsabilidad, la Kettenbach GmbH & Co. KG no asumirá responsabilidad alguna por las pérdidas o los daños causados por este producto, no importando si se trata de daños directos, indirectos, especiales, colaterales o consecuenciales e independientemente del fundamento legal, inclusive garantía, contrato, negligencia o culpa intencional.

Las indicaciones referentes a los productos Kettenbach se basan en una extensa investigación y experiencia en las técnicas de aplicación. Transmitimos estos resultados según nuestro leal saber, no obstante, reservándonos el derecho a realizar modificaciones técnicas con el fin de desarrollar el producto. Sin embargo, esto no exime al usuario de estos productos de comprobar todas las recomendaciones e indicaciones antes de su aplicación.

Actualización: 21 de julio de 2023

<div><span><span></span></span></div> <div><b>Manufacturer:</b></div>	
<b>Kettenbach GmbH &amp; Co. KG</b>	
<b>Im Heerfeld 7</b>	
<b>35713 Eschenburg</b>	
<b>Germany</b>	
	<b>Distributed in the U.S. by:</b>
	<b>Kettenbach LP</b>
	<b>62-64 Enter Lane</b>
	<b>Islandia, NY 11749</b>
	<b>USA</b>